

Katėms

Parazitai

Nors katės rečiau nei šunys serga erkių platinamomis ligomis, lauke vaikstančios katės taip pat rizikuoja užsikrėsti. Pavasarį dažnai suaktyvėja ir blusos.

Galimi požymiai:

- Intensyvus kasymasis ar laižymasis
- Odos paraudimai, šašeliai
- Plikimo ploteliai
- Juodi „trupinėliai“ kailyje (blusų ekskrementai)
- Vangumas (jei erkė perdavė infekciją)

Kaip turėtų elgtis šeimininkas:

- Reguliariai naudoti veterinaro rekomenduotas apsaugos priemones nuo išorinių parazitų.
- Po buvimo lauke apžiūrėti kailį ir odą.
- Pastebėjus erkę – ją saugiai pašalinti arba kreiptis į veterinarijos gydytoją.
- Jei niežulys stiprus ar atsiranda odos pažeidimų – nedelsti ir kreiptis į specialistą.
- Nepamiršti gydyti visų namuose esančių gyvūnų bei pasirūpinti aplinkos švara.

Virškinimo sutrikimai

Pavasariį katės dažniau būna lauke, gali suėsti žolės, netinkamo maisto ar grobio, todėl gali pasireikšti virškinimo problemos.

Galimi požymiai:

- Vėmimas
- Viduriavimas
- Apetito sumažėjimas
- Pilvo jautrumas
- Letargija

Kaip turėtų elgtis šeimininkas:

- Stebėti, ar simptomai trumpalaikiai (1 dieną) ar užsitęsia.
- Užtikrinti, kad katė gertų pakankamai vandens.
- Staiga nekeisti pašaro – naują maistą įvesti palaipsniui per 5–7 dienas.
- Jei vėmimas ar viduriavimas kartojasi, atsiranda kraujo, katė tampa vangė – būtina veterinaro konsultacija.

Kvėpavimo takų ligos

Permainingi pavasario orai gali išprovokuoti viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, ypač kačiukams ir vyresnio amžiaus katėms.

Galimi požymiai:

- Čiaudulys
- Akių ar nosies išskyros
- Ašarojimas
- Karščiavimas
- Apetito sumažėjimas
- Vangumas

Kaip turėtų elgtis šeimininkas:

- Stebėti, ar simptomai lengvi ir trumpalaikiai, ar stiprėja.
- Užtikrinti šiltą, be skersvėjų aplinką.
- Reguliariai valyti akių ir nosies išskyras (pagal veterinaro rekomendacijas).
- Jei katė atsisako ēsti ar simptomai trunka ilgiau nei kelias dienas – kreiptis į veterinarijos gydytoją.
- Pasirūpinti laiku atliekama vakcinacija.

Rujos laikotarpis

Pavasaris – aktyvus dauginimosi sezonas. Nesterilizuotos katės gali tapti neramesnės, garsiai miaukti, žymėti teritoriją ar bandyti pabėgti iš namų.

Galimi požymiai:

- Dažnas, garsus miaukimas
- Ridenimasis ant grindų
- Padidėjęs glaustymasis arba neramumas
- Noras išeiti į lauką

Kaip turėtų elgtis šeimininkas:

- Užtikrinti saugumą – neleisti katei pabėgti.
- Apsvarstyti sterilizaciją/kastraciją, kuri sumažina ne tik nepageidaujamo veisimosi, bet ir tam tikrų ligų riziką.
- Stebėti elgesį ir vengti streso situacijų.

Svarbiausia

Pavasari itin svarbi profilaktika, nuosekli apsauga nuo parazitų, laiku atliekami skiepai ir atidus katės elgesio stebėjimas. Ankstyva reakcija į pirmuosius požymius padeda išvengti rimtesnių sveikatos problemų ir užtikrina, kad šiltasis sezonas būtų saugus bei ramus tiek katei, tiek jos šeimininkui.